



CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ W JAROSŁAWIU

GASTROSKOPIA – INFORMACJE DLA PACJENTA

Gastroskopia jest badaniem pozwalającym lekarzowi na bezpośrednie oglądanie śluzówki żołądka, odźwiernika i dwunastnicy. Badanie przeprowadza się przy użyciu endoskopu, elastycznej rurki z torem wizyjnym pozwalającymi na przedstawienie obrazu z wnętrza przewodu pokarmowego na kolorowym monitorze. Ważną zaletą endoskopu jest możliwość w toku jednego zabiegu ocenienia stanu śluzówki, jak i pobrania do dalszego badania niewielkiego wycinka tkanki budzącej podejrzenie zmian chorobowych.

Sposób przygotowania do badania

- Na 8 godzin przed badaniem nie należy nic jeść.
- Na 4 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy.
- U pacjentów obciążonych ryzykiem, w tym u osób ze sztucznymi zastawkami serca, po przebytych zapaleniu wsierdza, z protezą naczyniową lub ze znacznie obniżoną liczbą krwinek białych bezpośrednio przed badaniem może być niezbędne podanie antybiotyku. Decyzję o konieczności i sposobie podania antybiotyku podejmuje lekarz kierujący na badanie.
- Badanie nie może być wykonane bez pisemnej zgody pacjenta lub jego opiekuna prawnego.
- Przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe.
- Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody.
- Na badanie proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości, skierowaniem na badanie i aktualnymi wynikami badań – zgodnie z ustaleniami z lekarzem .

Przebieg badania

Przed wprowadzeniem endoskopu lekarz bądź pielęgniarka (w wybranych przypadkach) znieczula gardło poprzez użycie odpowiedniego środka znieczulającego w sprayu. Złagodzenie nieprzyjemnych objawów występujących podczas badania ułatwia skupienie się na spokojnym, głębokim oddychaniu. Właściwy rytm oddechu sprawia, że badanie jest łatwiejsze do zniesienia dla pacjenta i pozwala lekarzowi na dokładniejsze zbadanie przewodu pokarmowego.

Po badaniu

- Przez dwie godziny po badaniu nie należy jeść, pić oraz palić.
- Jeśli zastosowane były środki znieczulające i / lub nasenne przeciwwskazane jest prowadzenie pojazdów przez kilka godzin po badaniu.

**W RAZIE WĄTPLIWOSCI PROSIMY O KIEROWANIE PYTAŃ
DO PERSONELU PRACOWNI ENDOSKOPII LUB
POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH.**