



CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ W JAROSŁAWIU

PRZEZSKÓRNA ENDOSKOPOWA GASTROSTOMIA (PEG) – INFORMACJE DLA PACJENTA

PEG – polega na założeniu cewnika wprowadzonego przez ścianę jamy brzusznej do żołądka przy pomocy gastroskopu.

Sposób przygotowania do badania

- Przed planowanym zabiegiem zapewniamy dostęp do żyły.
- Przed zabiegiem pacjent powinien pozostać na czczo minimum 8 godz.
- Na 5 dni przed zabiegiem należy zaprzestać przyjmowania kwasu acetylosalicylowego oraz innych preparatów wydłużających proces krzepnięcia. Heparyny drobnocząsteczkowe bywają podawane wieczorem dnia poprzedzającego zabieg.
- Prowadzona jest również profilaktyka antybiotykowa przed zabiegiem polegająca na podaniu pojedynczej dawki dożylniej tuż przed zabiegiem jako zabezpieczenie przed zakażeniem rany tuż po wykonaniu przezskórnej gastrostomii.
- Zabieg ten w zależności od warunków trwa 15- 45 min.
- Zabieg przeprowadza się w warunkach sali operacyjnej. Rodzaj znieczulenia określa lekarz prowadzący zabieg.
- Badanie nie może być wykonane bez pisemnej zgody pacjenta lub jego opiekuna prawnego.

**W RAZIE WĄTPLIWOSCI PROSIMY O KIEROWANIE PYTAŃ
DO PERSONELU PRACOWNI ENDOSKOPII LUB
POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH.**